

Patientvejledning

Kontaktblødning

Ved kontaktblødning og evt. ved pletblødning er det nødvendigt at foretage en udvidet undersøgelse af slimhinden i livmoderhalsen for at udelukke celleforandringer.

Undersøgelsen er ambulant og omfatter:

- Almindelig gynækologisk undersøgelse
- Kolposkopi (kikkertundersøgelse af livmodermunden)
- Ultralydsundersøgelse af livmoder og æggestokke
- Slimhindeprøve fra livmoderhalskanalen,
- Vævsprøve fra livmodermunden (biopsi) samt
- Dyrkning for bakterier (inkl. klamydia og evt Mycoplasma)

Du tilbydes en let lokalbedøvelse af livmoderhalsen, dog sjældent nødvendigt. Undersøgelsen varer 10-15 min. Derefter er du klar til at tage hjem eller på arbejde igen og må gerne køre bil.

Undersøgelsen går som regel let og uden større ubehag. Let blødning fra skeden er almindelig efter undersøgelsen og kan varer op til 1 uge men skal være aftagende. Vævsprøverne sendes til mikroskopisk undersøgelse på sygehusets Patologiske Institut. Resultatet af undersøgelsen foreligger efter 2-4 uger. Derefter vil du få besked via Lægevejen.

For at undgå infektion og øget blødning skal du undgå samleje, tamponer, karbad, svømmehal og havbad til blødningen er ophørt. Ved blødning over normal menstruationsstyrke, øget mængde udflåd, smerter eller feber, skal du kontakte klinikken, egen læge eller 1813.

Udarbejdet af Helle Christina Sørensen februar 2020

Revideres senest 2023